



# Levabon® Goldhefe

## Autolysert gjær - det beste for vomma

Autolysert gjær stimulerer vomfunksjonen. Dette kan bidra til å forebygge acidose. Slik sikres en optimal utnyttelse av både grovfôr og kraftfôr.

De naturlige antioksidantene bidrar til å deaktivere metabolitter, som for eksempel frie radikaler. Frie radikaler er, i tillegg til giftstoffer, ansvarlige for svekkingen av immunforsvaret, for leverskader, muskel- og klauvdegenerasjoner samt fruktbarhetsforstyrrelser. Bruk av autolysert gjær har vist seg å gi økt fôropptak og dermed bedre utnyttelse av det genetiske ytelsespotensialet.

### Virkemåte:

- autolysert gjær (Levabon® Rumen E) fremmer vomfunksjonen
  - ⇒ leverer høyt tilgjengelige mikronæringsstoffer
  - ⇒ stimulerer veksten av cellulospaltende bakterier
  - ⇒ forbedrer utnyttelsen av råfiber ⇒ høyere fôropptak
- stabiliserer pH-verdien i vomma
  - ⇒ økt aktivitet i nyttige mikroorganismer
  - ⇒ forbedrer klauvhelsen
- forbedrer dyrenes ytelse
  - ⇒ gir økt fôrfordøyelighet og bedre fôrutnyttelse
  - ⇒ høyere melkeytelse per dag
  - ⇒ raskere utvikling av vomma (kalver)
  - ⇒ høyere dagsopptak (foringdyr)
- 7000 mg naturlige flavonoider
  - ⇒ Flavonoider er de sterkeste kjente radikalene mot oksidativt stress
  - ⇒ 50 ganger økt antioksidanteffekt av vitamin E
  - ⇒ 20 ganger økt antioksidanteffekt av vitamin C
  - ⇒ 7000 mg flavonoider tilsvarer dermed antioksidanteffekten av 350 000 mg vitamin E og 140 000 mg vitamin C
- **Anti-Oxidative-Complex (AOC)** inneholder naturlige antioksidanter som minimerer oksidativt stress og stimulerer dyrenes motstandskraft

### Anbefalt for:

Levabon® Goldhefe fremmer fibernedbrytende bakterier hos alle drøvtyggere.

### Dosering:

Melkekyr: I løpet av de første 150 Laktasjonsdagene 50 – 70 g/dyr/dag, deretter kan det reduseres til 50 g/dyr/dag. Alternativt 50 g/dyr/dag gjennom hele laktasjonen.

Sinkyr: 30 – 40 g/dyr/dag

Kalver: Gjennom hele oppføringsperioden, 40 g/dyr/dag.

Ammeku: 50 g/dyr/dag.

Okser: 40 hele oppføringsperioden g/dyr/dag

Sau: 10 g/dyr/dag

Geit: 10 g/dyr/dag

Levabon® Goldhefe kan enten blandes i grov-, tilleggs- eller kraftfôret. Blandes den i kraftfôret, bør doseringen være basert på den maksimale kraftfôrmengden. Også høyere doseringer anbefales (80 g/dyr/dag).

### Holdbarhet:

12 måneder fra produksjonsdato

### Oppbevaring:

Lagres tørt og kjølig

### Forpakning:

25 kg sekk

Artikkelnummer: 16003

Din BIOMIN-konsulent bidrar gjerne med råd og tips!

